

Vogels

Je wordt je pas in het voorjaar bewust van de vogels om je heen. Dat komt omdat het in de winter vrij stil is geweest en er weinig gezongen werd door de vogels die aanwezig waren. Het is nu medio april en er is een gezang van jewelste van mussen, merels, koolmezen en in de verte een zanglijster! Vooral in de ochtendschemering. Ook omdat nu de paartijd is aangebroken en alle vogels op zoek zijn naar een geschikte partner om zich te reproduceren. Een nieuwe generatie voortbrengen en opvoeden. De vogelzang die nu te horen is betekent: "Hier ben ik" en "Kijk eens wat een mooie plek (territorium) ik heb gevonden om nakomelingen op te voeden".



Afb.1 Merelzang in de avondschemering. Alleen mannelijke merels hebben zang. Soms worden geluiden uit de omgeving in hun lied nagebootst. Verscheidene malen heb ik een merel een gsm oproep na horen doen. Vogelzang heeft een functie en is niet bedoeld om ons een plezier te doen. Het betekent: "Hier ben ik en dit is mijn territorium". Tijdens de paar- en broedperiode is de zang het mooist. Dit beeld oogt vredig maar de houding (lichaamstaal) van de merel beeldt uit dat dit zijn territorium is en concurrenten agressief worden geweerd.

Het is onnodig erop te attenderen dat zonder reproductie de soort al lang zou zijn uitgestorven. Het is voor mij iets onbegrijpelijks maar alle levende wezens en organismen zoals mensen, zoogdieren, ongewervelden enz. en ook planten, bacteriën en virussen willen zich voortplanten. Komt dat omdat alles op deze wereld slechts tijdelijk en van voorbijgaande aard is?



Afb.2 Zomaar in stilte overleden aan de vijver. Een natuurlijke dood?

Afb.3 Een sperwer heeft in onze tuin een huismus geslagen, een onnatuurlijke dood?

De natuur/evolutie heeft echter ook soorten voortgebracht die geen partner nodig hebben en zich zonder paring kunnen reproduceren. Zij worden ook wel hermafrodieten (zowel man als vrouw) genoemd. Een voorbeeld hiervan is de wijngaardslak. Toch kun je ze regelmatig met een partner zien vrijen, maar echt nodig is dat niet om nakomelingen te krijgen.



Afb.4 Wijngaardslakken hebben geen partner nodig om zich voort te planten. Zij zijn zowel man als vrouw. Toch zie je ze regelmatig sensueel vrijend met een soortgenoot.



Afb.5 Verreweg de meeste soorten op deze aarde hebben een mannelijke of vrouwelijke partner nodig om zich te reproduceren.

En dan bijvoorbeeld de angeldragers. Legt een vrouwtje/werkster een onbevucht ei dan wordt het een mannelijk individu. Legt een bevrucht vrouwtje (een werkster kan geen bevrucht ei leggen omdat zij niet bevrucht is) een ei, kan zij het sturen om een bevrucht of onbevucht ei te leggen. Legt zij een bevrucht ei dan wordt het een vrouwelijk individu.



Afb.6 en 7 Nest-observatiebuisen van solitaire bijen. Links van de gehoorde metselbij, rechts van de tronkenbij. Aan de voedselvoorraad/poppen is te zien of het een mannelijke of vrouwelijke bij wordt. Bij deze twee soorten zijn de vrouwtjes groter dan de mannetjes. Daarom hebben de vrouwtjes meer voedsel nodig.



Grondbloemen


Voor de vogels breekt nu een drukke periode aan. Partner zoeken, nest bouwen, paren, eieren leggen, broeden en de

jonge vogels opvoeden. Bij de meeste vogels helpen de mannen mee met het grootbrengen. Als de jonge vogels dan het nest verlaten loert het volgende gevaar om de hoek; o.a. katten. Mezen hebben daar geen last van omdat zij meteen goed kunnen vliegen. Het zijn vooral de jonge merels die daarmee geconfronteerd worden.



Afb.8 Een jonge, naïeve en onbevangen merel die de gevaren van de samenleving nog moet ontdekken. Dit is een kwetsbare periode, zeker als er katten in de buurt zijn.
 Afb.9 Twee jonge merels die al kunnen vliegen zitten te wachten op de meelwormen, die wij in droge perioden strooien.

Dat komt omdat de jonge merels bij het verlaten van het nest nauwelijks kunnen vliegen. Zij vertoeven dan enkele weken op de grond en zijn zodoende een gemakkelijke prooi voor katten. Wij horen aan de zang/alarmroep van een merel als er een kat in de buurt is. Dan is het weer tijd om het (grond)vuurwerk uit de kast te halen. Het zijn grondbloemen (maken een sissend geluid) die ervoor zorgen dat de kat er als een pijl vandoor gaat en niet zo gauw terug zal komen. Ik heb al van alles geprobeerd, maar dit helpt absoluut. Is het broedseizoen in volle gang voeren wij de vogels bij met meelwormen die o.a. in winkels voor vissersbenodigdheden te krijgen zijn.



Afb.10 en 11 Mam is voor haar jong, dat al in bedelhouding wacht, meelwormen komen halen.

Om de wormen te bemachtigen zetten de vogels hun schuw opzij en komen tot op een halve meter deze "lekkernij" halen. We hebben mezen gehad die ze uit de hand kwamen eten. Het is heel bijzonder om de kleine pootjes met nagels te voelen als ze op je hand zitten. Of die keer in Wenen bij [Café Landtmann](#) op het buitenterras. Weense stadsmussen die aan tafel meeeten aan een stuk taart met slagroom!



Afb.12 Een huismus kijkt toe hoe pimpelmezen de meelwormen uit de doos/hand komen eten. Met huismussen is ons dat nog niet gelukt.
 Afb.13 Ondanks het feit dat we met 3 mensen op het terras zaten, komt deze pimpelmees meelwormen voor zijn kroost halen.
 Afb.14 Deze pimpelmees is zo aan ons gewend dat hij de wormen uit de hand komt halen. Het geeft een heel apart gevoel van binnen als je die pootjes met die kleine nageltjes op je hand voelt. Ik heb me ook zitten afvragen of we de vogels zo tam moeten maken en of dat niet gevaarlijk voor hen is. In al die jaren dat we dit doen is gebleken, dat als ze drie weken niet bijgevoerd worden zij weer schuw zijn geworden. Alleen in het broedseizoen en in de winter krijgen zij meelwormen

Daar hebben we wel ontzettend veel plezier mee gehad. Schitterend. Dan kan ik me nauwelijks voorstellen dat er ook mensen zijn die bang zijn van vogels...

Muizen

Er zijn altijd vogels in de tuin. Geen bijzondere soorten, maar meer algemene soorten zoals koolmees, pimpelmees, merel, een groep huismussen (die ik de bende van Heugem heb genoemd), heggenmus, sinds dit voorjaar een koppel eksters (daar zijn we niet zo blij mee), houtduif, Turkse tortelduif en een enkele keer een vink of sperwer. Ik had al eens vaker aan de mussen gemerkt dat ze behoorlijk zenuwachtig waren. Bij het minste of geringste opvlogen en zich in de heg verstopten. Uiteindelijk heeft een sperwer toch een huismus te pakken

gekregen. Ik heb het vanuit de keuken door dubbel glas gefotografeerd, vandaar dat de scherpte iets nalaat.



Afb.15 Heel bijzonder was deze meikever, die opeens op het raamhor zat. Zeer waarschijnlijk is hij verantwoordelijk voor het afsterven van de blauwe regen. De laatste jaren wilde de plant niet goed meer groeien.

Afb.16 Enkele uren later vond ik enkele poten en de dekschilden terug. Hij is de prooi van een merel geworden. Verdorie, wat een verspilling was mijn eerste gedachte (en weer opnieuw als ik de beelden zie). Maar zo is de natuur. Eten of gegeten worden. Een constante strijd om te overleven.

Gedurende de wintermaanden voeren we ook met granen bij, zoals haverhout. Rozijnen, meelwormen en zonnebloempitten zijn ook zeer geliefd. De burens hebben drie katten die o.a. muizen vangen. Zij nemen die halfdode muizen mee en leggen deze ergens in hun tuin. Een enkele keer komen ze weer bij bewustzijn en zoeken dan een veilige plaats. Deze muizen pikken dan in de wintermaanden ook een graantje van de vogels mee. Een tuin hoeft niet groot te zijn om de natuur te beleven.



Afb.17 De tuintrend om alles vol met stenen en grind te leggen is niet meer in. Ik noem deze trend "tuinieren met steen" en het heeft niets meer met tuinieren van doen. Als ik op koopzondag de auto's bij het tuincentrum zie staan, krijg ik de indruk dat de mensen weer willen tuinieren met planten. Om zittend in het tuinbankstel of staand achter de tuinkeuken/gril te "genieten".

[hier voor album vogels Klik.](#)